



МОСАГРОГЕН
акционерное общество

УТВЕРЖДАЮ

ll.o Председатель Комитета
ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК

Л.Н. Чуркина Т.
02.11.2010



НАСТАВЛЕНИЕ
по ветеринарному применению
лекарственного препарата Магколистин®-Форте

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д.1, стр.1, пом.IV эт.1 ком 6.

Номер регистрационного удостоверения.....

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Магколистин®-Форте (Magcolistin forte).

Международное непатентованное наименование: колистин (полимиксин Е).

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Магколистин®-Форте в 1 мл в качестве действующего вещества содержит колистина сульфат – 12 000 000 международных единиц (МЕ), а в качестве вспомогательных веществ: трилон Б, метабисульфит натрия, сорбит, полиоксиалкиленгликоль, серную кислоту и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается легкая опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. После вскрытия упаковки неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

МАГКОЛИСТИН®-ФОРТЕ (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН

акционерное общество

4. Магколистин[®]-Форте выпускают расфасованным по 1 л в полиэтиленовые канистры, укупоренные пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Магколистин[®]-Форте следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Магколистин[®]-Форте отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Магколистин[®]-Форте относится к антибактериальным препаратам группы полипептидов.

10. Колистин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Haemophilus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Pasteurella* spp.. Обладает бактерицидным эффектом. В одинаковой степени активен как в отношении размножающихся клеток, так и находящихся в состоянии покоя. Приобретенная бактериальная резистентность развивается очень медленно.

Колистин, связываясь с фосфолипидами цитоплазматической мембранны бактериальной клетки, усиливает ее проницаемость, что ведет к деструкции клетки.

При пероральном применении колистин практически не вс�асывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях животного. Выводится из организма, главным образом, в неизмененной форме с фекалиями.

Магколистин[®]-Форте по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Магколистин[®]-Форте назначают поросятам, цыплятам-бройлерам, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур при желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии.

МАГКОЛИСТИН[®]-ФОРТЕ (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН
акционерное общество

12. Магколистин[®]-Форте противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности животных к компонентам препарата и тяжелой почечной недостаточности.

13. При работе с лекарственным препаратом Магколистин[®]-Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Магколистином[®]-Форте.

Канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Специальных исследований по применению Магколистин[®]-Форте свиноматкам в период беременности и лактации не проводили.

15. Магколистин[®]-Форте применяют перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- свиньям по 100 000 МЕ колистина на 1 кг массы животного в сутки (0,085 мл на 10 кг массы животного);
- сельскохозяйственным птицам по 75 000 МЕ колистина на 1 кг массы птицы.

Перед применением взбалтывать.

Для расчёта дозы препарата на 1 литр воды для поения использовать формулу

$$\text{Кол-во мл препарата на 1 л воды} = \frac{\text{МЕ на 1 кг массы х средняя масса птицы в кг}}{\text{МЕ в 1 мл препарата х суточная потребность птицы в воде (л/гол)}}$$

При групповом способе применения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

МАГКОЛИСТИН[®]-ФОРТЕ (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН
акционерное общество

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма. В этих случаях применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

18. Не допускается одновременное применение препарата Магколистин®-Форте с ампициллином, цефалоспоринами, аминогликозидными антибиотиками, а также с миорелаксантами.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы курс лечения необходимо возобновить в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. Убой поросят и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 48 часов после последнего применения лекарственного препарата Магколистин®-Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей после термической обработки.

Яйцо кур-несушек в период применения препарата разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 1.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 1,
стр. 1, пом. IV, эт. 1, ком 6.
тел. 8 (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова

МАГКОЛИСТИН®-ФОРТЕ (раствор для перорального применения)