




ПРОГЕСТАМАГ®

15% суспензия прогестерона

**ПРОГЕСТЕРОН - ГОРМОН
БЕРЕМЕННОСТИ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТЕЛЬНОСТИ**



ВСЕГО ОДНА ИНЪЕКЦИЯ

- лечение гипофункции яичников у коров
- снижение риска ранней эмбриональной смертности и аборт
- синхронизация половой охоты у коров и телок



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

ПРОГЕСТАМАГ®

15% СУСПЕНЗИЯ ПРОГЕСТЕРОНА

ПРОГЕСТАМАГ® относится к фармакологической группе гормоны. Применяется для лечения гипофункции яичников у коров, профилактики аборт и ранней эмбриональной смертности, синхронизации половой охоты у коров и тёлочек.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Прогестерон ингибирует гипоталамо-гипофизарную систему, вследствие этого не происходит выделение гонадотропных гормонов фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ), и в результате не происходит созревание фолликулов и овуляции. По окончании действия препарата происходит спонтанная секреция гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ, что приводит к созреванию фолликулов и их овуляции.

ДОЗЫ И СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - суспензия для инъекций.

СХЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ УЛЬТРАСИНХ

(ПРОГЕСТАМАГ® применяют:

коровам с суточным удоём до 25 л - 10 мл;

коровам с суточным удоём более 25 л - 15 мл)




СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ

(в течение первых 3-х недель после осеменения)



СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ГИПОФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

(при отсутствии половой охоты через 60 дней после отёла)





СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ Фолликулярных кист



Противопоказания:

- не применять самкам во II и III триместрах беременности.

Ограничения на использование продукции после последнего дня применения препарата:

- без ограничений.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5° С до 25° С.

Срок годности: 3 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 10 мл.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ