



МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Председатель Комитета
ветеринарного контроля и
надзора МСХ РК



К. Байжиев

02

2024 г.

НАСТАВЛЕНИЕ

по ветеринарному применению
лекарственного препарата Пигулин[®]-Форте раствор

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»

117545, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д.1

I. Общие положения

Торговое наименование лекарственного препарата: Пигулин[®]-Форте раствор (Pigulin-Forte solutio).

Международное непатентованное наименование: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) и хорионический гонадотропин человека (ХГч).

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Состав: лекарственный препарат в 1 мл содержит в качестве действующих веществ: 160 МЕ (международных единиц) ГСЖК и 50 МЕ ХГч, а в качестве вспомогательных компонентов: полисорбат 80, динатрия эдетат, натрия цитрат 2-х водный, пропиленгликоль, макрагола глицерилрицинолеат, бензетония хлорид и воду для инъекций.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость.

Пигулин[®]-Форте раствор выпускают расфасованным по 5, 10 и 20 мл в стеклянные флаконы вместимостью 10 и 20 мл, закупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают в картонные коробки по 20 шт. Каждую потребительскую упаковку снабжают соответствующим количеством инструкций по применению.



Этикетирование и маркировка. На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги писчей или бумаги этикеточной. Текст этикеток соответствует требованиям законодательства.

Хранение и транспортировка. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.

После вскрытия упаковки неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 8 °С.

Пигулин[®]-Форте раствор следует хранить в недоступном для детей месте.

Препарат транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, при температуре от 2 °С до 8 °С.

Методы уничтожения неиспользованного/недоиспользованного препарата.

Неиспользованный/недоиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Краткая характеристика.

Пигулин[®]-Форте раствор относится к фармакологической группе гормоны и их антагонисты.

Лекарственный препарат предназначен для однократного применения.

Пигулин[®]-Форте раствор представляет собой комплекс гонадотропных гормонов: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл и хорионический гонадотропин человека. ГСЖК обладает как фолликулостимулирующей, так и лютеинизирующей активностью, а ХГч – лютеинизирующей. Хорионический гонадотропин способствует овуляции и формированию желтого тела. Комбинированное действие двух гормонов позволяет индуцировать развитие у свиней полноценного полового цикла. Половая охота проявляется у животных через 3-6 дней после введения препарата.

Оба гонадотропина являются белковыми соединениями и в организме животных быстро метаболизируются до аминокислот.

Пигулин[®]-Форте раствор по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Пигулин[®]-Форте раствор отпускается без рецепта ветеринарного врача.



II. Порядок применения ветеринарного препарата

Подготовительные процедуры перед использованием препарата.

Перед использованием следует ознакомиться с настоящей инструкцией по применению ветеринарного препарата. Назначать и применять его имеет право дипломированный специалист ветеринарной медицины.

Запрещается применять животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат Пигулин[®]-Форте раствор супоросным животным и молодняку, не достигшему половой зрелости.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Процедура применения ветеринарного препарата.

Пигулин[®]-Форте раствор применяют однократно внутримышечно в область шеи или околушную область в количестве 5 мл (1 доза).

Ремонтным свинкам Пигулин[®]-Форте раствор применяют: с целью индукции половой охоты в возрасте 150-210 дней по достижении массы тела 90 кг; для синхронизации и стимуляции половой охоты, повышения оплодотворяемости и многоплодия – в возрасте 210 и более дней.

Свиноматкам с целью синхронизации половой охоты, повышения оплодотворяемости и многоплодия вводят одну дозу препарата сразу после отъема поросят или в течение последующих 48 часов. При анэструсе вводят одну дозу препарата в течение 14 дней после отъема поросят.

Показания для вынужденного применения ветеринарного препарата.

Пигулин[®]-Форте раствор применяют для регуляции воспроизводительной функции и повышения оплодотворяемости у ремонтных свинок и свиноматок.

Содержание и использование животных после применения ветеринарного препарата, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными препаратами.

Специальные мероприятия отсутствуют.

Сроки наступления иммунитета и его длительности при разных способах применения ветеринарного препарата.

Не применимо.

Реакция животных на ветеринарный препарат, включая реакцию в месте введения ветеринарного препарата и общей температурной и



клинической реакцией животного, а также их интенсивность и длительность.

При применении препарата Пигулин®-Форте раствор в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

Меры предотвращения возможных осложнений в результате применения ветеринарного препарата (включая причину осложнений, их вид, интенсивность и длительность).

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Использование сырья и продукции от животных, на которых применялся ветеринарный препарат (с указанием вида сырья и продукции и периода их использования после применения ветеринарного препарата).

Продукцию животноводства после применения препарата Пигулин®-Форте раствор можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Учет реакции на ветеринарный препарат, процедуры определения причин возникновения осложнений у животных после применения ветеринарного препарата или его неэффективности и порядка оформления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Меры предосторожности при применении

При работе с препаратом Пигулин®-Форте раствор следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Чертаново Центральное, проезд 1-й Дорожный, д.1
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова