РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСЛЕОТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КРС

ПРОФИЛАКТИКА ЭНДОМЕТРИТА У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ

НПВС доза согласно инструкции (нестероидное противовосп. ср-во)
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг
ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл

1 день — Интервал обработки

МАГЭСТРОФАН® 2-3 мл
МИКСОФЕРОН® 25 доз
АКВИТИН® 1,5 мл/100 кг

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ОКСИТОЦИН® 50-70 МЕ
МИКСОФЕРОН® 25 доз
Инфузия (для коров с задержанием последа)

1 день

ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг
ОКСИТОЦИН® 50-70 МЕ
МИКСОФЕРОН® 25 доз

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ОКСИТОЦИН® 50-70 МЕ
Инфузия (для коров с задержанием последа)

1 день

ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг
ОКСИТОЦИН® 50-70 МЕ
АКВИТИН® 1,5 мл/100 кг

Состав инфузии: глюкоза 40% - 300 мл, кальция хлорид 10% - 100 мл, кальция борглюконат 20% - 300 мл, натрия хлорид 0,9% - 300 мл, раствор Рингера-Локка - 200 мл, уротропин 40% - 100 мл, новокаин 0.5% - 200мл, новокаин 2% - 100 мл, кофеин бензоат натрия - 10 мл, цианокобаломин - 10 мл.

Позволяет снизить риск развития заболеваний острым и хроническим эндометритом у новотельных животных.
Применяется всем животным с задержанием последа.
При регистрации послеотельных осложнений более чем у 20 % животных схема применяется ко всем отелившимся животным.
Отделять послед вручную запрещается!

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОТЕЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИТА

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЭНДОМЕТРИТА

МАГЭСТРОФАН® 2-3 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день — Интервал обработки

1 день

ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день

1 день

ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

Применяется для профилактики и лечения на 6-8 день после отела. Позволяет проводить эффективную терапию и одновременно производить товарное молоко без выбраковки в период лечения.

АО «Мосагроген» выпускает высокоэффективный 10 % **ЦЕФТИМАГ®** (цефтиофур) с дозировкой 1 мл/100 кг и без выбраковки молока в период лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг или ПУЛЬМАМАГ® 1 мл/40 кг

1 день — Интервал обработки

МАГЭСТРОФАН® 2-3 мл

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг или ПУЛЬМАМАГ® 1 мл/40 кг

1 день

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг или ПУЛЬМАМАГ® 1 мл/40 кг

Применяется при диагностировании эндометрита на 12-14 день после отела.
ПУЛЬМАМАГ® - высокоэффективен при **микоплазменной патологии**.
ЦЕФТИМАГ® - товарное молоко без выбраковки в период лечения.

АО «Мосагроген» выпускает высокоэффективный препарат **ПУЛЬМАМАГ ®** (20% суспензия азитромицина) с дозировкой 1 мл/40 кг.

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА ПРИ ПАТОЛОГИЯХ В ЯИЧНИКАХ

СХЕМА 1 (ЭНДОМЕТРИТ И ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА ИЛИ ДОМИНАНТНЫЙ ФОЛЛИКУЛ)

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день — Интервал обработки

СУРФАГОН 100 мкг

1 день

СУРФАГОН 100 мкг

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день

СУРФАГОН 100 мкг

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

8 дней

МАГЭСТРОФАН® 2-3 мл

При крупной фолликулярной кисте доза препарата **МАГЭСТРОФАН®** должна быть увеличена до 4 мл.

СХЕМА 2 (ЭНДОМЕТРИТ И ПРИСУТСТВИЕ ЖЕЛТОГО ТЕЛА ИЛИ ЛЮТЕАЛЬНОЙ КИСТЫ)

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день — Интервал обработки

МАГЭСТРОФАН® 2-4 мл

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

1 день

1 день

МАГЭСТРОФАН® 2-4 мл

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг

Для лечения крупной лютеальной кисты рекомендуется повысить дозу препарата МАГЭСТРОФАНА® до 4 мл.

СХЕМА 3 (ЭНДОМЕТРИТ И ГИПОФУНКЦИЯ ЯИЧНИКА)

ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100 кг
ПРОГЕСТАМАГ® 10 мл

1 день — Интервал обработки

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100кг

1 день

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
ЦЕФТИМАГ® 1 мл/100кг

1 день

1 день

ЭНДОМЕТРАМАГ® 50-150 мл
МАГЭСТРОФАН® 2-3 мл
ФОЛЛИМАГ® 1000 МЕ

Данная схема позволяет осемененять животных на начальной стадии гипофункции яичников.

АО «Мосагроген» выпускает высокоэффективные гормональные препараты **ПРОГЕСТАМАГ®** (15% суспензия прогестерона) с дозировкой 10 мл/гол. и **ФОЛЛИМАГ®** (ГСЖК - гормон сыворотки крови жеребых кобыл) с дозировкой 1000 МЕ/гол.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Во всех приведенных схемах выбор конкретного препарата ЭНДОМЕТРАМАГ®-Т, ЭНДОМЕТРАМАГ®-К, ЭНДОМЕТРАМАГ®-БИО или ЭНДОМЕТРАМАГ®-ГРИН основывается на результате подтитровки действия антибиотика на выделенный возбудитель.

2. В схемах 1-3 для активации иммунитета, снижения негативного действия стресс факторов, а в летний период для снижения уровня кортизола в условиях гипертермии, рекомендуется дополнительно 2 иньекции препарата МИКСОФЕРОН® по 25 доз. Для активации обменных процессов 2 иньекции препарата АКВИТИН® в дозе 1,5 мл/100 кг в 1-й и последний дни лечения.

+7(495) 744-0645
www.mosagrogen.ru
ИМПУЛЬС ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ПОГОЛОВЬЯ

производство МОСАГРОГЕН ветеринарных препаратов