



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Председатель Комитета

ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК



С. Тюпегенов

2024 г.

НАСТАВЛЕНИЕ

по ветеринарному применению
лекарственного препарата Эндометраг-Био[®]

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»

117545, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д.1

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-4487-21

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Эндометраг-Био[®]
(Endometramag-Bio).

Международные непатентованные наименования действующих веществ:
пропранолол, бензетония хлорид.

Лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения.

Эндометраг-Био[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержит
пропранолола гидрохлорида - 15 мг, бензетония хлорида - 0,75 мг, а также
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилцеллюлозу, динатрия эдетат
(Трилон Б) и воду очищенную.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой слегка
опалесцирующую жидкость зеленовато-желтого цвета.

Эндометраг-Био[®] выпускают расфасованным по 1 л в полиэтиленовые
канистры соответствующей вместимости, укупоренные резьбовыми



МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Этикетирование и маркировка. На каждую канистру (бутылку) наклеивают этикетку из бумаги писчей или бумаги этикеточной. Текст этикеток соответствует требованиям законодательства.

Хранение и транспортировка. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 года с даты производства. Запрещается использование лекарственного препарата после окончания срока его годности.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25 °C.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Препарат транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, при температуре от 5°C до 25°C.

Методы уничтожение неиспользованного/недоиспользованного препарата.

Неиспользованный/недоиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Краткая характеристика.

Эндометраг-Био[®] относится к антисептическим препаратам.

Пропранолол – действующее вещество Эндометрага-Био[®] - усиливает сократительную способность миометрия матки, а бензетония хлорид оказывает бактерицидное действие в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Бензетоний активен в отношении дрожжей и ряда грибов, а также некоторых внеклеточно расположенных вирусов.

Препарат не оказывает прижигающего действия на слизистую оболочку матки и способствует регенерации эндометрия.

В рекомендуемых дозах препарат хорошо переносится животными, не оказывает местнораздражающего действия, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

Компоненты препарата плохо всасываются через слизистую оболочку матки, что предотвращает их накопление в продуктах животноводства и молоке.

Эндометраг-Био[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007).

Эндометраг-Био[®] отпускается без рецепта ветеринарного врача.



II. Порядок применения ветеринарного препарата

Подготовительные процедуры перед использованием препарата.

Перед использованием следует ознакомиться с настоящей инструкцией по применению ветеринарного препарата. Назначать и применять его имеет право дипломированный специалист ветеринарной медицины.

Запрещено применение лекарственного препарата беременным животным.

Разрешено применение в период лактации.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

Процедура применения ветеринарного препарата.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для лечения эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ с интервалом 24-48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3-5 введений. При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

Для профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ после отделения последа, абортот или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

Показания для вынужденного применения ветеринарного препарата.

Эндометраг-Био® применяют для лечения эндометрита у коров и профилактики послеродовых акушерских заболеваний.

Содержание и использование животных после применения ветеринарного препарата, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными препаратами.



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

Специальные мероприятия отсутствуют.

Сроки наступления иммунитета и его длительности при разных способах применения ветеринарного препарата.

Не применимо.

Реакция животных на ветеринарный препарат, включая реакцию в месте введения ветеринарного препарата и общей температурной и клинической реакций животного, а также их интенсивность и длительность.

При применении Эндометрамага-Био® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

Меры предотвращения возможных осложнений в результате применения ветеринарного препарата (включая причину осложнений, их вид, интенсивность и длительность).

Запрещается применение лекарственного препарата при повышенной чувствительности животного к компонентам препарата.

Не допускается одновременное применение Эндометрамага-Био® с ксилазином, ксиланитом, рометаром, ромпуном.

Симптомы передозировки у коров не выявлены.

Использование сырья и продукции от животных, на которых применялся ветеринарный препарат (с указанием вида сырья и продукции и периода их использования после применения ветеринарного препарата).

Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Учет реакции на ветеринарный препарат, процедуры определения причин возникновения осложнений у животных после применения ветеринарного препарата или его неэффективности и порядка оформления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Меры предосторожности при применении.



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

При работе с Эндометрамагом-Био® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Эндометрамаг-Био®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем или
держателем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, вн.тер.г.муниципальный
округ Чертаново Центральное,
проезд 1-й Дорожный, д.1
тел. 8 (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова

ЭНДОМЕТРАМАГ - БИО® (раствор для внутриматочного введения)