




УРОТРОПИН®

40% раствор гексаметилентетрамина (метенамина)



**НАДЁЖНЫЙ
АНТИСЕПТИК
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ**



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ПРЕПАРАТ
С АНТИТОКСИЧЕСКИМ
И ДИУРЕТИЧЕСКИМ
СВОЙСТВАМИ**



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

УРОТРОПИН®

МЕТЕНАМИН - 400 МГ

УРОТРОПИН® - уроантисептик, антибактериальный препарат для системного использования. Оказывает мочегонное действие, повышает проницаемость мембран клеток, ускоряя выведение токсинов из организма.

Применяют:

- при воспалении почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей
- для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений со стороны мочевыводящих путей
- при интоксикациях и токсикоинфекциях с целью нейтрализации и ускорения выведения токсинов из организма
- в комплексной терапии при лечении эндометритов и маститов с признаками интоксикации у коров.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В кислой среде, особенно почек и мочевыводящих путей, метенамин расщепляется на формальдегид и аммиак, которые проявляют антибактериальное действие.

Выделение препарата и его метаболитов с мочой начинается через 40-60 минут после введения препарата и продолжается 6-12 часов.

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - раствор для инъекций.

Препарат применяют внутривенно 2-3 раза в сутки в следующих дозах:

- КРС 1,5-2 мл на 10 кг массы тела
- свиньям (в ушную вену) и овцам 0,5-0,7 мл на 10 кг массы тела

Длительность применения препарата и доза зависят от характера и тяжести протекания заболевания, но не должна превышать 4 дней.

В мочевых путях КРС действие метенамина выражено слабее из-за щелочной реакции мочи.

В этом случае необходимо назначать вещества, сдвигающие реакцию мочи в кислую сторону, например аскорбиновая кислота или комплексный витаминный препарат Аквитин® (внутримышечно).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- в комплексе с антибактериальными препаратами снижает выработку резистентности у бактерий
- АО «Мосагроген» - единственный в России производитель препарата Уротропин®, применяемого в ветеринарии

Противопоказания:

- запрещено применение в период беременности, в период лактации, новорожденным животным.

Ограничения на использование продукции после последнего дня применения препарата:

- для мяса свиней - 1 сутки.
- для мяса КРС - 1 сутки.
- молоко - 1 сутки.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 20 мл.

РАСТВОРЫ