



БРОМКОЛИН®

колистин - 300000 МЕ, линкомицин - 100 мг, бромгексин - 5 мг



СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

БРОМКОЛИН®

ЛИНКОМИЦИН - 100 мг КОЛИСТИН - 300000 МЕ БРОМГЕКСИН - 5 мг

БРОМКОЛИН® - комплексный антимикробный препарат широкого спектра действия с муколитическим и отхаркивающим эффектом. Применяют молодняку свиней, крупному и мелкому рогатому скоту, собакам и кошкам при респираторных заболеваниях, сопровождающихся образованием трудноотделяемого вязкого секрета (хроническая пневмония, бронхит, трахеобронхит) и при желудочно-кишечных инфекциях, вызванных микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Линкомицин проявляет наибольшую активность в отношении большинства Гр(+) микроорганизмов, в том числе стафилококков, стрептококков, пневмококков, клостридий, коринобактерий, а также микоплазм. Механизм действия связан с подавлением синтеза белка в микробных клетках. Линкомицин проникает во все органы и ткани организма, включая костную ткань.

Колистин действует только против Гр(-) микроорганизмов, обладает бактерицидным эффектом. Связываясь с фосфолипидами цитоплазматической мембраны бактериальной клетки, усиливает ее проницаемость, что ведет к деструкции клетки. В одинаковой степени активен, как в отношении размножающихся клеток, так и находящихся в состоянии покоя.

Комбинация антибактериальных компонентов препарата обладает синергическим действием. Приобретенная бактериальная резистентность развивается медленно.

Бромгексин, входящий в состав препарата, оказывает муколитическое (секретолитическое) и отхаркивающее действие. Снижает вязкость бронхиального секрета, благодаря чему облегчает спонтанное отхождение мокроты. Не обладает протеолитическим действием и поэтому предупреждает повреждение слизистой бронхов. Механизм действия обусловлен деполимеризацией мукопротеинов и мукосахаридов, в результате чего уменьшается вязкость бронхиального секрета.

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - раствор для инъекций.

Применяется внутримышечно (с осторожностью, в виду возможной местной реакции) или подкожно в следующих дозах:

- свиньям, молодняку крупного и мелкого рогатого скота, из расчета 1 мл препарата на 10 кг живой массы животного, один раз в день в течение 5 дней
- собакам и кошкам, из расчета 2 мл препарата на 10 кг живой массы животного

ПРЕИМУЩЕСТВА

- действует бактерицидно и бактериостатически
- обладает синергизмом действующих веществ
- комплексное воздействие на патогенез болезни
- восстанавливает мукоцилиарную систему

Противопоказания:

- не применять одновременно с аминогликозидами (гентамицин, неомицин), а также с миорелаксантами и анестетиками (угроза развития паралича дыхательных мышц).

Ограничения на использование продукции после последнего применения препарата:

- для мяса - 7 суток.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

АНТИМИКРОБНЫЕ