



АЦИЛОМАГ®

10% амоксициллин + 5% энрофлоксацин

препарат с двойным механизмом действия

АМОКСИЦИЛЛИН:

разрушает клеточную стенку и нарушает осмотический баланс бактериальной клетки

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРУ

БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ




Комбинация антибиотиков обеспечивает:

- широкий спектр действия
- снижение риска развития резистентности
- высокую активность при остром и хроническом течении болезни
- снижение вероятности рецидивов и развития осложнений
- стабильный и долговременный клинический эффект
- минимизацию затрат на лечение

ЭНРОФЛОКСАЦИН:

подавляя активность фермента гиразы, предотвращает рост и деление бактериальной клетки



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

АЦИЛОМАГ®

АМОКСИЦИЛЛИН - 100 мг

ЭНРОФЛОКСАЦИН- 50 мг

АЦИЛОМАГ® - комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра действия. Применяют свиньям, крупному рогатому скоту и овцам для лечения колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, респираторных и других бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину и энрофлоксацину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных (*Actinomyces* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*,

Staphylococcus spp., *Streptococcus* spp.) и грамотрицательных микроорганизмов (*Actinobacillus* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *E.coli*, *Salmonella* spp., *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus mirabilis*). Не действует на пенициллиназообразующие штаммы микроорганизмов. Механизм бактерицидного действия амоксициллина заключается в нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки. При парентеральном применении амоксициллин хорошо всасывается из места введения и проникает в большинство органов и тканей животного. Максимальная концентрация антибиотика в крови отмечается через 2 часа и удерживается на терапевтическом уровне не менее 48 часов после применения лекарственного препарата. Связь с белками плазмы составляет 17-20%.

Энрофлоксацин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Механизм действия энрофлоксацина основан на способности ингибировать активность фермента гиразы. На микробную клетку действует бактерицидно. При внутримышечном введении энрофлоксацин быстро всасывается в кровь из места инъекции и проникает практически во все органы и ткани, достигая максимальной концентрации через 0,5-1 час после введения. После однократной инъекции терапевтическая концентрация энрофлоксацина сохраняется в организме в течение 24 часов.

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - раствор для инъекций.

Применяется внутримышечно в суточной дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 3-5 дней, свиноматкам при синдроме ММА - в течение 1-2 дней. Перед использованием содержимое флакона тщательно встряхивают до получения однородной суспензии.

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место взрослому крупному рогатому скоту более 15 мл, овцам, телятам и свиньям более 5 мл, поросятам - более 2,5 мл лекарственного препарата. После введения препарата рекомендуется массировать место инъекции.

Противопоказания:

- не применять самкам в период беременности.
- запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными препаратами, а также применять одновременно с бактериостатическими антибактериальными средствами (линкозамидами, макролидами, сульфаниламидами, тетрациклинами), препаратами группы пенициллинов и фторхинолонов.

Ограничения на использование продукции после последнего применения препарата:

- для мяса - 14 суток.
- для молока - 4 суток.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

АНТИМИКРОБНЫЕ