



ЦЕФТИМАГ®

10 % суспензия цефтифура гидрохлорида

ШИРОКИЙ СПЕКТР БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМАЗАМ



высокая терапевтическая концентрация в течение 24 часов

возможность назначения беременным, лактирующим животным и молодняку

отсутствие ограничений по использованию молока для пищевых целей

Лечение инфекций:

-  органов дыхания
-  желудочно-кишечного тракта
-  мочеполовой системы
-  некробактериоза
-  острого эндометрита КРС
-  синдрома ММА свиноматок



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

ЦЕФТИМАГ®

10 % СУСПЕНЗИЯ ЦЕФТИФУРА ГИДРОХЛОРИДА

ЦЕФТИМАГ® - антибактериальный препарат группы цефалоспоринов с широким спектром действия. Разрешён к применению беременным и лактирующим животным. Назначают для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, некробактериоза и острого эндометрита крупного рогатого скота, синдрома ММА свиноматок, а также других болезней бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Механизм антибактериального действия цефтиофура заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз и карбоксипептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

ЦЕФТИМАГ® оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу и некоторые анаэробные бактерии: *Escherichia coli*, *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp., *Actinomyces pyogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus bovis*, *Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*).

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - суспензия для инъекций.

Вводят один раз в сутки в течение 3-5 дней:

- крупному рогатому скоту - 1 мл на 100 кг массы животного п/к или в/м;
- свиньям - 1 мл на 32 кг массы животного в/м.

10% концентрация цефтиофура гидрохлорида в препарате позволяет ускорить достижение терапевтических значений и оперативно купировать острый воспалительный процесс. Максимально допустимый объём введения препарата в одно место - не более 15 мл.

Не вызывает местной побочной реакции.

Для повышения эффективности лечения необходимо принимать меры по повышению иммунитета и активации обменных процессов животных:

- иммуномодулятор Миксоферон® - 20-30 доз на голову двукратно с интервалом 48 часов;
- комплексный витаминный препарат Аквитин® - 2 мл на 100 кг массы животного однократно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сокращает % падежа и предотвращает снижение веса поросят сосунов при респираторных заболеваниях, желудочно-кишечных патологиях, болезнях конечностей и кожного покрова, кастрации и скалывание клычков.

Ограничения на использование продукции после последнего применения препарата:

- для мяса свиней - 5 суток.
- для мяса КРС - 5 суток.
- для молока - без ограничений.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности: 3 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

АНТИМИКРОБНЫЕ